



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО



«МУБОҲИСАИ ИЛМӢ: МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМ,
ДАСТОВАРДҲО ВА ИННОВАТСИЯ ДАР ТИБ»

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ»

«SCIENTIFIC DISCUSSION:
CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS
AND INNOVATIONS IN MEDICINE»



Материалы XIV международной
научно-практической конференции
молодых ученых и студентов, посвящённой
«Годам развития села, туризма и народных ремесел
(2019-2021)»



19 апреля 2019
Душанбе (Dushanbe)



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**



**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО**

**«МУБОҲИСАИ ИЛМӢ: МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМ,
ДАСТОВАРДҲО ВА ИННОВАТСИЯ ДАР ТИБ»**

**«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ»**

**«SCIENTIFIC DISCUSSION:
CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS IN MEDICINE»**

*Материалы XIV международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов, посвящённой «Годам развития села,
туризма и народных ремесел (2019-2021)»*

19 апреля 2019

Душанбе (Dushanbe)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ

А.Д. Ромахова, Ю.Ц.Петрова

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 ОрГМУ. Россия.

Научный руководитель – к.м.н., доцент Колосова Е.Г.

Цель исследования. Проанализировать качество жизни пациентов, страдающих стенокардией.

Материалы и методы. Анкетирование пациентов, имеющих различные формы стенокардии, в стационарах Новосергиевской и Илекской районных больницах с помощью Сиэтловского опросника качества жизни при стенокардии (Seattle Angina Questionnaire). Объем выборок составил 10 и 20 пациентов со стенокардией соответственно. Статистическая обработка была проведена в системе для статистического анализа StatSoft Statistica 10.

Результаты. 70% пациентов имеют ограничение физической нагрузки, оцениваемое в данной анкете как достаточно сильное; 45% пациентов оценивают имеющуюся стенокардию как нестабильную; 30% пациентов не удовлетворены проводимым лечением; 85% пациентов часто беспокоятся о возможном сердечном приступе и о том, что могут внезапно умереть.

Выводы. В результате проведенного анализа было установлено, что стенокардия представляет собой большую медико-социальную проблему из-за выраженного снижения качества жизни. Для ее решения необходимо широко вводить в практику врача данный опросник, чтобы оценивать свою лечебную и профилактическую работу и иметь возможность ее корректировать в нужном направлении. Кроме того, результаты данного опросника акцентируют внимание на необходимости проведения физической и психической реабилитации, которой не все специалисты уделяют должное внимание.

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ДЕМОТИВАЦИИ В АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

А.И. Рудюк

Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического права ЗГМУ. Запорожье.

Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Заричная Т.П.

Цель исследования. Изучение факторов демотивации в аптечных предприятиях.

Материалы и методы. Статистически обработанная информация, которая получена в результате опроса (анкетирование и интервьюирование) 30 провизоров и фармацевтов аптечной сети «Аптеки низких цен».

Результаты исследования. Были исследованы следующие факторы демотивации в вышеуказанной аптечной сети: непосредственное управление и контроль, условия труда, межличностные взаимоотношения, заработная плата и стабильность работы, внутренняя политика организации по отношению к персоналу (факторы демотивации по Ф.Герцбергу).

Данные факторы были предложены для оценки по 5-балльной системе фармацевтическим сотрудникам в исследуемых аптеках.

Для определения значимости отдельных факторов демотивации к труду персонала оценки, полученные в результате анкетирования и интервьюирования, пересчитаны в соответствующий удельный вес компоненты (W_{ij}). Для этого суммировали ответы по каждому фактору демотивации. Фактор, который имеет максимальную оценку, принят за «1». Значимость остальных факторов демотивации рассчитывали, как отношение суммы ответа по параметру, который получил максимальную оценку.

Результаты данных расчетов показали, что наиболее значимыми демотивационными факторами являются система межличностных взаимоотношений ($W_{ij} = 1$) и непосредственное руководство, контроль ($W_{ij} = 0,97$). То есть, если в коллективе неблагоприятный психологический климат и администрация жестко осуществляет контроль над персоналом, то мотивация к труду у последних значительно снижается.

Также для фармацевтического персонала важна внутренняя политика организации по отношению к персоналу ($W_{ij} = 0,96$). Работникам аптечных предприятий хотелось бы чувствовать внимание, участие, понимание и заботу со стороны своих руководителей.

Менее значимыми факторами демотивации являются условия труда ($W_{ij} = 0,93$), заработная плата и стабильность работы ($W_{ij} = 0,93$).

Выводы. Изучены факторы демотивации в аптечных предприятиях. Выделены наиболее значимые из них. Данная работа будет продолжена.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК В ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

З.А. Гулбекова

Кафедра эпидемиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан

Научный руководитель – д.м.н., профессор Одинаев Н.С.

Цель исследования. Изучить особенности распространения заболеваний почек в Горно-Бадахшанской автономной области в сравнении с другими областями республики.

Материал и методы. Данное исследование проведено на основании ежегодных статистических отчетов Центра Медицинской статистики и информации при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в период 2013-2017 годов по различным заболеваниям почек у взрослого населения.