

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР**  
**«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»**

## **ЗБІРКА ТЕЗ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**  
**«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ**  
**УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК У ПРАКТИКУ**  
**ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я»**

*26-27 жовтня 2017 р.*

**м. Запоріжжя**

# **ОРГКОМІТЕТ**

## **Голова оргкомітету**

Ректор Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **Ю.М. Колесник**

## **Заступники голови**

Проректор з наукової роботи Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **В.О. Туманський**

Директор ННМЦ «Університетська клініка»,  
Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **В.І. Кривенко**

## **Члени оргкомітету**

к.мед.н., доцент М.О. Авраменко, д.мед.н., професор В.А. Візір,  
к.мед.н., доцент С.А. Моргунова, д.мед.н., доцент М.Ю. Колесник,  
д.мед.н., доцент О.В. Возний, д.біол.н., доцент С.В. Павлов, д.мед.н. А.В. Демченко,  
к.мед.н. В.В. Вакуленко, Е.В. Котляревська, Л.І. Бородавко

## **Відповідальний секретар**

д.мед.н. А.В. Демченко

## **Секретаріат**

А.В. Алтухов, О.М. Кіосов

Сучасні аспекти лікувально-діагностичної тактики у хворих на гостру емпієму плеври Перцов В.І., Телушко Я.В., Савченко С.І. ....	42
Кореляційний зв'язок між рівнем прозапальних цитокінів та важкістю гострого некротичного панкреатиту Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Білик О.М., Ляховченко Н.А., Зацерковна О.М., Леванчук А.С., Паньків К.М. ....	43
Роль мутації в гені PRSS1 у розвитку гострого некротичного панкреатиту Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Леванчук А.С., Паньків К.М., Зацерковна О.М., Білик О.М., Ляховченко Н.А. ....	44
Antioxidant and cardioprotective properties of the tamoxifeni citrati in case of cardiomyocytes hypoxic damage Pavlov S.V., Levchenko K.V. ....	45
Рання ультразвукова діагностика хронічного аутоімунного тиреоїдиту Радомська Т.Ю., Кучугурна Т.А. ....	46
Стан варіабельності серцевого ритму у хворих на цукровий діабет 2 типу Радомська Т.Ю., Алтухов А.В., Салівон-Гончаренко А.А. ....	46
Ефективність лікування хворих з поєднаним перебігом хіміорезистентного туберкульозу та цукрового діабету Разнатовська О.М., Бобровнича-Двізова Ю.М. ....	47
Кореляційні зв'язки рівнів імуноглобулінів у сироватці крові з показниками туберкулінових проб у дітей, хворих на вперше діагностований туберкульоз Разнатовська О.М., Мирончук Ю. В. ....	48
Оценка поражения периферических нервных волокон у работников тяжелой промышленности Ромалийская О.В., Демченко А.В., Козенко М.В. ....	49
Застосування сучасних інформаційних технологій та індивідуальних завдань студентам для оптимізації їх самостійної роботи на кафедрі терапевтичної стоматології Романова Ю.Г., Гончаренко О.В., Коваль С.М. ....	49
Определение эффективности солевой системы для глубокого фторирования «Ftorcalcit-D» при лечении гиперестезии твердых тканей зубов Рябокоть Е.Н., Волкова О.С., Токарь А.А., Каннуник Т.С. ....	50
Клиническая оценка эффективности лечения катарального гингивита с применением стоматологического геля «Холисал» Рябокоть Е.Н., Андреева Е.В., Крючко А.И. ....	51
Антимикробная активность комплексных препаратов на растительной основе Рябокоть Е.Н., Стеблянко Л.В., Баглык Т.В., Катурова Г.Ф., Кирсанова А.В. ....	52
Корекція синдрому надлишкового бактеріального росту при неалкогольному стеатогепатиті Свистун С.І., Горбаткова Н.Г., Дудко Е.В., Світлицька О.А., Алтухов А.В. ....	52
Основні помилки допущені студентами при препаруванні зубів під штамповану коронку Сидоренко О.О., Збарах О.О. ....	53
Особливості появи виражених діастем верхньої щелепи у дітей народжених від матерів перенісших токсикоз першого триместру вагітності Сидоренко А.Ю. ....	54

циркулярний карієс (15%); глибоке підясневе препарування, як наслідок маргінальний періодонтит (10%). Висновки. Проведене дослідження показало, що найбільш серйозною проблемою при препаруванні фантомних моделей зубів більш ніж на 0.3 мм, що являється нормою при припасуванні штампованої коронки. Це свідчить про недостатність ортопедичних навичок і доводить основні недоліки майбутнього лікаря-стоматолога. Знаючи основні проблеми при препаруванні під штамповану коронку студент зможе опанувати і не повторювати вище зазначені помилки.

## **ОСОБЛИВОСТІ ПОЯВИ ВИРАЖЕНИХ ДІАСТЕМ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ ПЕРЕНІСШИХ ТОКСИКОЗ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ ВАГІТНОСТІ**

Сидоренко А.Ю.

Запорізький державний медичний університет  
Кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

Вступ. Охорона здоров'я жінки та дитини є одним з важливіших напрямів в діяльності нашої держави. Соціально-економічні проблеми в усіх сферах життя, недоліки медичного обслуговування, низька культура репродуктивної поведінки - всі ці фактори згубно відбилися на здоров'ї майбутніх матерів, призвели до росту кількості ускладнень вагітності та пологів, погіршення стану здоров'я новонароджених. Встановлено, що внутрішньоутробний період вагітності є одним з найважливіших факторів в розвитку людського організму, в тому числі формування функціонально повноцінної зубощелепної системи. Значну роль в розвитку зубощелепних аномалій відіграють ускладнення перебігу вагітності, а саме токсикоз першої половини вагітності. Вплив цього антенатального чинника до теперішнього часу залишається недостатньо вивченим. Мета: На підставі вивчення впливу медико-соціальних антенатальних чинників ризику на виникнення зубощелепних аномалій, визначити особливості появи виражених діастем верхньої щелепи у дітей народжених від матерів, що перенесли токсикоз першого триместру вагітності. Матеріали та методи: Поставлені завдання були вирішені за допомогою клінічного та аналітично-статистичного методів. Дослідження проводились на базі медичних пунктів дошкільних закладів міста Запоріжжя дітей 2-6 років, на базі кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології ЗДМУ. Було здійснено анкетування та аналіз історій хвороб 184 матерів та їх дітей, котрі регулярно відвідували лікаря-стоматолога. Результати: У дослідженні відмічений статистично значущий зв'язок між медико-соціальним фактором ризику, а саме токсикозом першого триместру вагітності матерів та виникненням виражених діастем верхньої щелепи у дітей віком від 2 до 6 років. Також відома кореляція токсикозу першого триместру вагітності та діастемами верхньої щелепи. 75 (40,76%) з опитуваних матерів мали токсикоз першого триместру вагітності. Їх діти розвивались з вираженою діастемою верхньої щелепи. В 16 (8,96%) випадках мали токсикоз, але діти були здорові. Інша частина досліджуваних 76 (41,3%) за наявності токсикозу не мали виражених діастем та 17 (9,23%) матерів, у який перший триместр пройшов без токсикозу, діти мали фізіологічну діастему. Висновки: отже, під впливом такого фактора, як токсикоз першого триместру

вагітності, рівень зубощелепних аномалій, а саме, виражена діастема верхньої щелепи, збільшується, тому важливим етапом профілактики такої патології є своєчасне виявлення впливів на матір несприятливих медико-соціальних факторів в період вагітності.

## **ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ О ПРАВИЛАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА**

Смирнова И.В.

Запорожский государственный медицинский университет  
Кафедра терапевтической, ортопедической и детской стоматологии

Цель исследования. Установить уровень осведомлённости о правилах гигиенического ухода за полостью рта и их выполнение пациентами с сердечно-сосудистой патологией. Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КУ «ОМЦССЗ» ЗОС. 130 пациентов с сердечно-сосудистой патологией в возрасте 18 лет и старше заполнили анонимные анкеты закрытого типа, состоявшие из нескольких блоков вопросов, в том числе и вопросов, касающихся гигиенической грамотности и мотивированности соблюдения правил гигиены полости рта. Полученные результаты. Установлено, что неукоснительно правила личной гигиены по уходу за полостью рта (чистка зубов не менее двух раз в день, своевременная замена зубных щёток) соблюдает только треть населения. Примечательно и то, что затруднились сказать, какой зубной пастой пользуются более 20% пациентов, а это по сути каждый пятый респондент. Более 15% населения постоянно пользуются отбеливающими пастами. Пастами, снижающими кровоточивость десен, пользуются 11, 54%, а пастами, содержащими фтор, пользуются менее 20%. Пасты для зубов с повышенной чувствительностью применяют 13% пациентов, а 18% пациентов выбирают пасты с хорошими освежающими свойствами, не обращая внимание на их состав и назначение. Вывод: была выявлена недостаточная информированность населения о правилах гигиенического ухода за полостью рта и несоблюдение этих правил. Для повышения гигиенической грамотности среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией необходимо проводить врачами – стоматологами не только профилактические беседы, но и обучать гигиеническим навыкам, помогать пациенту в выборе средств по уходу за полостью рта в соответствии с клинической ситуацией.

## **ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ**

Тарабаров С.А.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепр

Введение: В настоящее время в мире остаются дискуссионными вопросы выбора эндоскопического метода удаления неоплазий толстой кишки в зависимости от их размеров и вида. Цель работы: проанализировать рекомендации и результаты исследований ведущих мировых экспертов в эндоскопии по методам эндоскопического удаления неоплазий толстой кишки. Материалы и методы: