



УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Рецензенты: член-корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор Висмонт Ф. И.; д.м.н., профессор Таганович А. Д.; заслуженный деятель науки РБ, д.м.н., профессор Третьяк С. И.

Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015"  
сборник тезисов докладов 69-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием.

В авторской редакции.

/под редакцией профессора О. К. Кулаги, профессора Е. В. Барковского, -  
Минск: БГМУ, 2015/

ISBN 978-985-567-176-4

Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященных широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и практической медицины и фармации. Рекомендован студентам высших учебных медицинских заведений и медицинских колледжей, врачам, научным сотрудникам.

ISBN 978-985-567-176-4



УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

*Белинский Б. О.*

**ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСОРИАЗА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ст. преп. Соколовская И. А.  
Кафедра общей гигиены и экологии Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина*

**Актуальность.** Псориаз (чешуйчатый лишай) – наиболее распространенное хроническое, часто рецидивирующее, системное полигенное заболевание. В настоящее время псориаз считается мультифакториальным заболеванием, в генезе которого играет роль как наследственный фактор, так и многочисленные факторы внешней среды.

**Цель:** изучить особенности заболеваемости псориазом в условиях влияния загрязнения атмосферного воздуха.

**Задачи:**

1 Изучить особенности заболеваемости псориазом в промышленном регионе на основании социально-гигиенического мониторинга.

**Материал и методы.** Для оценки комплексного влияния факторов среды использован подход, в основе которого лежит сопоставление среднерайонных характеристик отдельных ее факторов с соответствующими среднерегionalными показателями, принимаемыми за стандарт (эталон).

**Результаты и их обсуждение.** Наиболее высокие уровни распространенности псориаза в Запорожской области зарегистрированы в г. Запорожье, Гуляйпольском, Веселовском, Куйбышевском, Приморском и Васильевском районах. В указанных административных единицах распространенность псориаза находилась в пределах 269,6 – 513,8 сл./100 тыс.

**Выводы:**

1 Для достижения стойкой ремиссии у пациентов с псориазом обязательно осуществлять коррекцию экзогенных и эндогенных триггерных факторов с целью минимизации их воздействия.

2 Материалы социально-гигиенического мониторинга заболеваемости псориазом Запорожской области целесообразно использовать для разработки управленческих решений по охране воздушного и водного бассейна от техногенного загрязнения.