



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»**

4 лютого 2022 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ректор ЗДМУ, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Туманський В.О.;

голова Координаційної ради з наукової роботи студентів, проф. Беленічев І.Ф.;

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, проф. Павлов С.В.;

секретар Координаційної ради з наукової роботи студентів, ст. викл. Абросімов Ю.Ю.;

голова студентської ради ЗДМУ Федоров А.І.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

заступник голови студентської ради Будагов Р.І.; голова навчально-наукового сектору студентської ради Єложенко І.Л.

З боку ЖКТ ПА та ПВ підгруп різниця між симптомами не мала достовірної різниці. У 10% хворих зустрічалися нудота та рідкі випорожнення. Не було виявлено відмінностей з боку нервової системи: аносмія та агевзія майже у 9% випадків, головокружіння у 10% та поодинокі випадки парестезій в обох підгрупах.

При порівнянні симптоматики з боку ЖКТ ІВ та ПА підгруп була виявлена різниця ($p < 0,05$) між частотою відсутності апетиту (51,6% в ПА підгрупі проти 16,5% у ІВ). Була відмічена тенденція до більш частішої появи нудоти в ПА підгрупі (9,7% проти 1,7%), рідкі випорожнення реєструвалися у 10% пацієнтів обох підгруп. При порівнянні неврологічної симптоматики було відмічено більш часту появу аносмії та дисгевзії в ПА підгрупі (11,3% проти 7%), головокружіння зустрічалися в обох підгрупах у 12% пацієнтів.

Висновки. Серед госпіталізованих хворих з COVID-19 має місце формування певного спектру позалеженої симптоматики, а частота формування окремих ознак залежить від клінічного перебігу коронавірусної хвороби.

ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАХВОРЮВАННЯ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ

Петріщев В. В.

Науковий керівник: доц. Ясінський Р.М.

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Запорізький державний медичний університет

Мета. Встановити типи відношення до хвороби у пацієнтів на різних етапах лікування вперше діагностованого туберкульозу легень (ВДТБ).

Матеріали та методи. Обстежено 60 пацієнтів із ВДТБ, які лікувались у КНП «Запорізький регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» ЗОР протягом 2021 року. Хворих розподілили на 3 групи залежно від тривалості лікування: 1 група (хворі, які лікувались 1-й місяць (20 осіб); 2 група (хворі, які лікувались 2-3 місяці (20 осіб); 3 група (хворі, які лікувались понад 3 місяці (20 осіб). Пацієнти не відрізнялись за віковими та гендерними ознаками в групах, $p > 0,05$. Тип відношення до хвороби встановлювали за методикою ТОБОЛ (Л.І. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Іовлев, Е.Б. Карпова, 1987). Статистична обробка їх даних проводилася за допомогою програми "STATISTICA для Windows 13.0".

Результати. У пацієнтів 1 групи домінували наступні типи відношення до хвороби: гармонічний ($23,8 \pm 1,6$), ергопатичний ($18,3 \pm 1,7$), анозогнозичний ($20,9 \pm 1,6$) од., $p < 0,05$. У хворих 2 групи: сенситивний ($27,2 \pm 1,2$), гармонічний ($26,2 \pm 2,3$), ергопатичний ($21,8 \pm 1,9$) од., проте мали значення анозогнозичний ($17,2 \pm 1,6$), тривожний ($15,6 \pm 1,3$) та неврастенічний ($17,0 \pm 1,7$) од., $p < 0,05$. У пацієнтів із 3 групи домінували гармонічний ($30,0 \pm 2,7$), ергопатичний ($24,0 \pm 1,5$), анозогнозичний ($23,0 \pm 1,7$) типи відношень до захворювання, проте мав значення також сенситивний тип ($16,8 \pm 1,5$) од., $p < 0,05$.

Висновки. У хворих, які розпочинають протитуберкульозну терапію домінуючі типи відношення до хвороби свідчать про збереження соціальної та психічної адаптації. У хворих, які лікуються 2-3 місяці та більше з'являються варіанти дезадаптивної поведінки. Це може бути обумовлено тривалістю лікування, появою побічних реакцій на лікарські засоби, усвідомленням соціальної небезпеки захворювання та неясністю прогнозів щодовилікування.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗНАЧИМІСТЬ ЦИНКУ ПРИ ІНФЕКЦІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

Печугіна В.В.

Науковий керівник: проф. Усачова О.В.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Запорізький державний медичний університет

Мета дослідження: на підставі аналізу сучасних літературних даних з'ясувати значимість цинку при інфекційній патології у дітей.

Матеріали та методи: для реалізації мети було проаналізовано доступну сучасну літературу за останні п'ять років.

Отримані результати: Аналіз сучасних літературних джерел показав, що цинк є важливим мікронутрієнтом, який бере участь у регуляції вроджених та адаптивних імунних реакцій. Він бере