

О.В. Крайдашенко, В.В. Сиволап, Р.В. Стец

ЗАПОРОЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МОЗ УКРАИНЫ

Сообщения о побочных реакциях на лекарственные средства

Информация о пациенте

Больной 22 лет. Диагноз: Сахарный диабет 1 тип, тяжелая форма, декомпенсация.
Хр. пиелонефрит, обострение.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Норфлоксацин, таблетки 500 мг. Производитель: ООО фармацевтическая компания «Здоровье», Украина.
Назначен по 1 таблетке 2 раза в день per os в качестве антибактериального средства.

Описание побочной реакции

После применения таблеток появились боль в правом подреберье, тошнота, жидкий стул.

Сопутствующие препараты

Нолипрел, актрапид.

Коррекция побочной реакции

Отмена подозреваемого лекарственного препарата.

Особенности клиники, последствия

После отмены препарата побочные явления исчезли через 2 дня.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощён. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались.

Информация предоставлена Областным клиническим
эндокринологическим диспансером г. Запорожья

Информация о пациенте

Больной 54 лет. Диагноз: Острый бронхит, хр. пиелонефрит.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Хемомицин, капсулы по 250 мг. Производитель: «Nemofarm», Сербия и Черногория.
Назначен по 1 капс. 2 раза в день per os в качестве антибактериального средства.

Описание побочной реакции

После одного дня приема препарата появились покраснение и мелкоточечные высыпания на руках и передней части грудной клетки, сильный зуд.

Сопутствующие препараты

Амбробене, поливитамины.

Коррекция побочной реакции

Отмены препарата, пипольфен по 1 таб. 2 р/день.

Особенности клиники, последствия

После отмены препарата и приема пипольфена указанные явления исчезли через 2 суток.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Пищевая аллергия на клубнику.

Информация предоставлена КП «Городская поликлиника им. 8 марта»

Информация о пациенте

Больной 57 лет. Диагноз: Госпитальная пневмония верхней доли правого легкого 3 гр., тяжелое течение, ЛСН 2.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Цефтриаксон, пор. д/инфузий, 1000 мг. Производитель: Блис Биотек, Индия.

Назначен по 1000 мг 2р/сутки в/м в качестве антибактериального средства.

Описание побочной реакции

При первом введении препарата у больного появились гиперемия, зуд в глазных яблоках, чихание, затрудненное носовое дыхание, зуд кожи туловища, рук, в этих местах появились волдыри;

Сопутствующие препараты

Нет.

Коррекция побочной реакции

Супрастин 2% 2,0 в/м, Преднизолон 60 мг парентерально с переходом на короткий курс – 20-30 мг 5-7 дней, седативная терапия, энтеросорбенты: активированный уголь, энтеросгель.

Особенности клиники, последствия

Состояние нормализовалось, рекомендовано наблюдение у аллерголога.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощён. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались. Злоупотребление алкоголем.

Информация предоставлена поликлиникой 6 городской клинической больницы

Вы можете тысячам пациентам, если сделаете одну простую вещь – сообщите о подозреваемой побочной реакции на лекарственное средство!

Крайдашенко Олег Викторович (профессор, зав. кафедрой клин. фармакологии):

т.р. 995-429; т.моб. 8050-5880933

Стец Роман Витальевич (к.мед.н., кафедра клин. фармакологии):

т.р. (0612) 342558; т.д. 2369755; т.моб. 8099-7172103, 8098-2127925; e-mail: stets@list.ru.

Адрес: 69035, г. Запорожье, пр. Маяковского, 26, ЗГМУ, кафедра клин. фармакологии.