

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Фізіологічний журнал

том 56 № 2 2010

Науково-теоретичний журнал • Заснований у січні 1955 р.

Виходить 1 раз на 2 місяці

**Матеріали XVIII зізду Українського фізіологічного товариства
з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010 р.**

Зміст

Розділ I.	Молекулярна та клітинна фізіологія	3
Розділ II.	Системна нейрофізіологія	23
Розділ III.	Психофізіологія	58
Розділ IV.	Фізіологія серцево-судинної системи	91
Розділ V.	Імунологія	120
Розділ VI.	Фізіологія ендокринної системи	128
Розділ VII.	Нервово-м'язова фізіологія	148
Розділ VIII.	Фізіологія дихання	156
Розділ IX.	Фізіологія крові	175
Розділ X.	Фізіологія травлення	184
Розділ XI.	Вікова фізіологія	208
Розділ XII.	Екологічна фізіологія та вплив екстремальних факторів	222
Розділ XIII.	Фізіологія рухів	241
Розділ XIV.	Фізіологія спорту	255
Розділ XV.	Клінічна фізіологія	271
Розділ XVI.	Фізіологія сільськогосподарських тварин	292
Розділ XVII.	Історія фізіології	310

Оргкомітет з'їзду

П.Г. Костюк – голова (Київ)
В.М. Казаков – заступник голови (Донецьк)
В.М.Запорожан – заступник голови (Одеса)
М.Р. Гжегоцький (Львів)
Л.М.Карпов (Одеса)
В.М. Мороз (Вінниця)
П.А.Неруш (Дніпропетровськ)
В.Ф.Сагач (Київ)
О.А.Шандра (Одеса)
Л.М. Шаповал (Київ)

Пленарні лекції:

- 1) акад. НАН України О.О. Кришталь. ПЕРВИННІ МЕХАНІЗМИ НОЦИЦЕПЦІЇ
- 2) акад. АМН України В.М. Казаков. НОВЕ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛАНКИ РЕГУЛЯЦІЇ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ
- 3) акад. НАН України О.О. Мойбенко. КАРДІОМ – НОВА КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- 4) акад. АМН України В.М. Запорожан, д. мед. н. О.Л. Холодкова. СУЧASNІ БIОТЕХНОЛОГІЇ В РЕГЕНЕРАЦІЇ УШКОДЖЕНИХ ТКАНИН
- 5) член-кор. НАН України О.Г. Резніков. ПЕРИНАТАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
- 6) член-кор. НАН України В.Ф. Сагач. РОЛЬ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІТОХОНДРІЙ У РЕАКЦІЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ II. СИСТЕМНА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ

СТАН ЕНКЕФАЛІНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ КРУПНОКЛІТИННИХ НЕЙРОНІВ ГІПОТАЛАМУСА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

А.В. Абрамов, М.М. Карнаух

Запорізький державний медичний університет

Дослідження, які було виконано на щурах і мишиах з експериментальними формами діабету, а також клінічні спостереження хворих з обома типами цукрового діабету вказують на можливу зміну функціонального стану гіпоталамічної енкефалінергічної системи. Так, у щурах зі стрептозотоциніндукованим діабетом і пацієнтів з діабетом 1-го типу значно підвищується концентрація мет-енкефалину в плазмі та лікворі. А прийом страви хворими на діабет сумісно з введенням коригувальної дози інсуліну теж призводить до додаткового підвищення концентрації мет-енкефалину в крові. Але стан енкефалінергічних нейронів гіпоталамуса при цукровому діабеті досі не вивчено. Мета дослідження – вивчити розподіл мет- та лей-енкефалінсінтеzuючих нейронів у паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамуса. Роботу виконано на 5 контрольних та на 12 щурах з експериментальним цукровим діабетом, який моделювали однократним введенням стрептозотоцину в дозі 50 мг/кг. Ідентифікацію мет-енкефалину (*metE*) та лей-енкефалину (*лейE*) в гіпоталамічних нейронах робили за допомогою імунофлюоресцентної реакції з полікліональними антитілами до відповідних нейропептидів («Amersham», США). У контрольних тварин найбільша кількість *metE*-нейронів локалізувалася в задньому крупноклітинному суб'ядрі паравентрикулярного ядра (зкПВЯ) – 28±5, та вдвічі менш в супраоптичному ядрі (СОЯ) – 12±2. Водночас кількість *лейE*-нейронів в обох структурах була однакова (11-12)±2. За 2 тиж розвитку діабету кількість *metE*-нейронів у гіпоталамусі підвищилася удвічі та в 4 рази в порівнянні з контролем через 5 тиж. При цьому сумарний вміст *metE* значно підвищився як у гіпоталамічних нейронах, так і у серединному підвищенні гіпоталамуса. Кількість *лейE*-нейронів у крупноклітинних нейронах гіпоталамуса за перші 2 тиж розвитку діабету збільшилася в 4 рази, а надалі знижувалася майже до контрольних значень. Але в зкПВЯ та в серединному підвищенні гіпоталамуса зберігався суттєво підвищений вміст *лейE*. Розвиток експериментального цукрового діабету призводить до підвищення синтезу нейропептидів опіоїдного ряду – екнефалінів – у крупноклітинних нейронах ПВЯ та СОЯ і супроводжується посиленням їх секреції до серединного підвищенні гіпоталамуса.

ФАРМАКОЛОГІЧНА МОДУЛЯЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІNU В ІШЕМІЗОВАНОМУ ГОЛОВНОМУ МОЗКУ

I.Ф. Беленічев, Г.О. Жернова, А.В. Абрамов

Запорізький державний медичний університет

Для підвищення ефективності фармакотерапії геморагічного інсульту (ГІ) перспективним є використання препаратів, здатних активувати власні біоенергетичні та відновлювальні процеси у нервовій тканині. Одним із важливих напрямків у фармакокорекції патологічних процесів є попередження загибелі життєздатних нейронів, відновлення їх адекватного енергозабезпечення за рахунок модуляції активності мітохондрій. Підтримання іонних градієнтів – необхідна умова функціонування мітохондрій і нейронів у цілому. Це можливо лише при адекватній роботі усіх типів іонних насосів і збереженні бар’єрної функції мітохондріальних мембран. ГІ є пусковим механізмом цілої низки патологічних процесів, серед яких хотілося б виділити відхилення у роботі транспортного (дихального) ланцюга у вигляді посиленого утворення у ньому побічних токсичних продуктів (O_2^{\cdot} , H_2O_2 , OH^{\cdot} , $NOON^{\cdot}$), а також посилене надход-